



Sentier nature DU COL DE L'ESCRINET

Livret d'aide à la découverte



Mot d'accueil

Bonjour et bienvenue sur le **sentier de découverte de la nature du col de l'escrinet**.

Ce livret a été réalisé par la Commission "Animations en Milieu Scolaire" qui est une commission spécialisée de la Fédération Départementale des Chasseurs de l'Ardèche. Cette commission, composée d'enseignants, a pour objectif de mettre en valeur le patrimoine ardéchois, et plus particulièrement la faune sauvage.

Il a pour objectif de servir de guide aux visiteurs pour une découverte approfondie du sentier nature du col de l'escrinet.

Les accompagnateurs de groupes trouveront dans ce livret des informations très utiles et complémentaires à ce qu'ils pourront observer sur le sentier.



LA FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE DES CHASSEURS DE L'ARDÈCHE (FDC 07)

La FDC 07 est, en nombre d'adhérents, la deuxième association du département. Elle regroupe les 12 500 chasseurs du département (saison 2006/2007). Sont également adhérentes les 400 associations de chasse présentes en Ardèche.

Dirigée par un conseil d'administration de 16 élus, elle emploie 10 salariés au service de la chasse ardéchoise.

LA FDC 07 CONDUIT DIVERSES MISSIONS.

- Conseil en gestion et aménagement faune sauvage,
- Assistance technique et juridique aux sociétés de chasse,
- Études scientifiques sur la faune sauvage,
- Suivi sanitaire de la faune sauvage
- Initiation à la nature,
- Formation des nouveaux chasseurs et indemnisation des dégâts de grands gibiers sont des missions de service public.

mode d'emploi

Le sentier de découverte de la nature du col de l'escrinet est composé de stations pour découvrir le milieu.

La randonnée qui vous attend n'est pas anodine.

La nature va vous livrer quelques uns de ses secrets.

Sachez être curieux, attentifs, respectueux, c'est ainsi qu'elle se livrera.

Ouvrez les yeux, écoutez, et tournez les pages au fil de votre randonnée, à chaque station, à chaque halte une page de ce livret vous apportera des informations complémentaires.

PAGE 4	le renard
PAGE 5	le chevreuil
PAGE 6	le sanglier
PAGE 7	la genette
PAGE 8	le lièvre
PAGES 9-10	la chaîne alimentaire
PAGE 11	la migration
PAGE 12	les indices de présence
PAGE 13	la chasse
PAGES 14-15	la déprise agricole

sommaire



illustrations W. Arlaud
graphisme JC Debout
photographies FDC Ardèche
impression Fombon

le renard

Ordre des Carnivores
Famille des Canidés
Genre Vulpes
Espèce vulpes



I - DESCRIPTION

Le pelage peut varier du roux au grisâtre. La queue est longue et touffue, blanche à l'extrémité, les oreilles sont droites et pointues.

II - HABITAT

IL EST PRÉSENT
DANS TOUS LES MILIEUX :

- plaines
- landes
- zones humides

III - ALIMENTATION

Omnivore.

Au gré des saisons il adapte son alimentation aux ressources du milieu.

Tout au long de l'année il se régale de petits rongeurs, de fruits, de déchets qu'il trouve autour des habitations.

Dans les endroits riches en lapins, le renard se spécialise pour la capture de cet animal.

IV - REPRODUCTION

Rut de décembre à février. Gestation d'une cinquantaine de jours.
3 à 7 renardeaux naissent dans le terrier au mois de mars.

V - MOEURS

Solitaire, il est actif principalement la nuit. Le mâle et la femelle peuvent chasser tous les deux pour alimenter les renardeaux.

VI - MORTALITE

- PRÉDATEURS : Le renard n'a pas encore (2007) de prédateurs.
- MALADIES : La rage est la maladie la plus connue chez le renard. C'est une maladie grave qui peut se transmettre à l'homme. Grâce à la vaccination des renards elle a quasiment disparu de France. Des épisodes réguliers de gale (maladie de la peau) sont constatés. En affaiblissant les animaux, ceux-ci peuvent en mourir.

VII - SITUATION EN ARDECHE

Présent dans tout le département.



le chevreuil

Ordre des Artiodactyles
Famille des Cervidés
Genre Capreolus
Espèce capreolus



I - DESCRIPTION

Le mâle appelé **Brocard** porte des bois qui tombent en Octobre-Novembre et repoussent aussitôt. Ils sont frayés en février-mars. La femelle se nomme Chevette, le jeune Chevrillard. Le chevreuil est brun roux en été, brun sombre en hiver. En Ardèche son poids varie de 20 à 30 kg.

II - HABITAT

Le chevreuil peut être rencontré en tous lieux. Les massifs boisés entrecoupés de plaines cultivées, de clairières sont ses lieux de vie privilégiés.

III - ALIMENTATION

Herbivore.

Il consomme des jeunes pousses d'arbres (bourgeons, feuilles, ...), des fruits forestiers et des plantes herbacées.

Il se nourrit également de cultures agricoles : vergers, vignes...

IV - REPRODUCTION

Le rut a lieu en juillet-août.

La chevrette, après 9 mois et demi de gestation met bas en mai-juin généralement 2 chevrillards.

Ils sont allaités durant l'été et restent souvent avec leur mère l'hiver suivant.

V - MOEURS

On peut voir le chevreuil à tout moment de la journée car, même s'il a beaucoup d'activités la nuit, c'est un animal qui se déplace et se nourrit également la journée. Animal territorial, le brocard durant la saison de reproduction, marque son territoire à l'aide de glandes odorantes placées à la base des bois, sur les pattes et entre les sabots.

VI - MORTALITE

► **PRÉDATEURS** : Seul un sanglier, un renard ou encore un chien errant peuvent attraper un chevrillard.

► **AUTRES CAUSES** : La fauche des prairies, si elle coïncide avec les périodes de mises bas, peut être catastrophique pour les chevrillards cachés dans les prés. Les collisions avec les voitures sont également une cause de mortalité importante.

VII - SITUATION EN ARDECHE

Le chevreuil a été réintroduit en Ardèche par les chasseurs et l'Office National des Forêts. Pendant 4 ans (de 1978 à 1981) ce sont 200 chevreuils qui ont été lâchés (50 par an) en Ardèche en deux endroits : Région de St Agrève et Massif du Tanargue.

En 2007 la population est estimée entre 15 000 et 20 000 individus. Le Chevreuil est présent dans toutes les communes de l'Ardèche.

le sanglier

I - DESCRIPTION

Animal robuste à forte carrure, il est pourvu de muscles puissants. De couleur sombre, gris-noir lorsqu'il est adulte, à 1 an environ.

DE 0 À 6 MOIS : marcassin, rayures noires et marron, alternées avec un peu de blanc.

DE 6 MOIS À 1 AN : bête rousse car il a alors une couleur rousse.

La femelle s'appelle la laie, le mâle le sanglier.

II - HABITAT

Principalement en forêt.

III - ALIMENTATION

Omnivore, il consomme des végétaux, des petits animaux, des charognes...

Son régime alimentaire est composé pour 90 % environ de substances végétales avec des préférences pour les fruits forestiers : glands, fâines, châtaignes.

IV - REPRODUCTION

Le rut a lieu en décembre-janvier.

La laie met bas au printemps.

Les marcassins pèsent à la naissance environ 1 kg.

On dit qu'elle met bas 1 petit pour 10 kg de son poids.

A 1 an ils pèsent de 30 à 50 kg.

Ensuite, suivant la disponibilité en nourriture ils peuvent grossir de 10 à 30 kg par an les années suivantes.

En Ardèche les plus gros mâles atteignent 150 kg, les femelles 110 kg environ.


Les marcassins sont sevrés à 3-4 mois.

Ordre des Artiodactyles

Famille des Suidés

Genre Sus

Espèce scrofa



V - MOEURS

Nocturne. Les femelles vivent en groupes de 2 à 5 accompagnées de leurs marcassins. Ce groupe s'appelle une compagnie.

Les mâles vivent en solitaire et rejoignent les compagnies à la saison du rut.

VI - MORTALITE

► PRÉDATEURS : Le sanglier n'a pas encore (2007) de prédateurs en Ardèche.

VII - SITUATION EN ARDECHE

Le sanglier est présent partout.

Les plus fortes populations du département se situent dans le sud, les Cévennes, la haute vallée de la rivière Ardèche, la vallée de l'Eyrieux.

la genette

Ordre des Carnivores
Famille des Viverridés
Genre Genetta
Espèce genetta

I - DESCRIPTION

Animal gris et noir au corps allongé (90 cm).
La queue est longue et épaisse "annelée" de gris et de noir.

II - HABITAT

Habite les terrains rocaillieux, forêts des régions ensoleillées (elle est peu présente au Nord de la Loire). Elle apprécie la proximité d'un plan d'eau.



III - ALIMENTATION

Prédateur de nombreuses espèces, elle consomme prioritairement les petits mammifères : rats, campagnols, mulots, mais se nourrit également d'oisillons, lapereaux, batraciens, ...

IV - REPRODUCTION

Elle peut faire deux portées par an de 1 à 3 jeunes. La gestation dure 70 jours, l'allaitement 4 à 5 mois et les jeunes s'émancipent entre 6 et 9 mois.

V - MOEURS

Elle est nocturne. Difficile à observer car très discrète. C'est un animal solitaire.

VI - MORTALITE

- PRÉDATION : Seul le hibou grand duc et le renard peuvent être considérés comme les prédateurs potentiels de la genette.
- AUTRES CAUSES : La genette paie un lourd tribut sur les routes.

VII - SITUATION EN ARDECHE

La genette est présente sur toutes les zones bien exposées au Sud/Sud-est (versants de la Vallée du Rhône, Coiron, Plateau de Basse Ardèche, bassin d'Aubenas, de Privas et des Vans). On la retrouve dans notre département jusqu'à 800 - 1 000 m d'altitude.

le lièvre

Ordre des Lagomorphes
Famille des Léporidés
Genre Lepus
Espèce europaeus



I - DESCRIPTION

Il pèse de 3 à 5 kg. Il est brun roux. Il possède de longues oreilles aux extrémités noires et de longues pattes arrières. Le mâle s'appelle le bouquin, la femelle la hase.

II - HABITAT

Zones ouvertes, cultivées en céréales, vergers, vignes. Egalement présent sur les zones d'élevage d'ovins et bovins mais en densité moins importante.

III - ALIMENTATION

Il se nourrit de pousses de blé, tournesol, et ronge parfois les arbres tels que les pommiers. Il consomme en grande quantité les graminées sauvages.

IV - REPRODUCTION

La hase peut faire 2 à 4 portées dans l'année. Chaque portée comprend 1 à 4 levrauts. L'essentiel des naissances a lieu au printemps.

Les levrauts naissent à même le sol, dans un champ, une culture, et sont cachés par la végétation. La hase vient alors les allaiter une fois par jour. Au bout d'un mois ils s'émancipent.

V - MOEURS

Surtout nocturne mais on peut le voir à tout moment de la journée durant la période de reproduction (janvier à août - septembre). Animal solitaire, il a plusieurs lieux de repos que l'on nomme des gîtes.

VI - MORTALITE

- PRÉDATEURS : les jeunes et les animaux affaiblis ont un grand nombre de prédateurs : chats et chiens errants, renards, corvidés, buses, autours des palombes, fouines, martres, putois, sangliers...
- AUTRES CAUSES : les machines agricoles, notamment lors de l'ensilage au printemps détruisent de nombreuses portées.
- Les traitements, ayant pour objectif de faire disparaître les "mauvaises herbes" dans les vignes, vergers... font diminuer les zones d'alimentation du lièvre.
- Enfin, la disparition des zones agricoles au profit des zones boisées entraîne une chute des populations de lièvres.

VII - SITUATION EN ARDECHE

Le lièvre est présent dans toutes les régions agricoles. C'est au Nord du département que l'on en rencontre le plus. Une gestion rigoureuse de la part des chasseurs depuis 1992 a permis d'augmenter sensiblement les effectifs.



la chaîne alimentaire

DÉFINITION : "rapport nutritionnel qui existe entre les différentes espèces, depuis le végétal jusqu'à l'homme".

Il faut ici relier les éléments entre eux.

L'écureuil (*SCIURUS VULGARIS*), consommateur connu de noisettes, est également friand de glands, faînes, noix, bourgeons, fruits, champignons ; il se nourrit également des petits animaux: escargots, insectes, oisillons... Il contribue à la dissémination de certains arbres car il fait à l'automne des provisions de glands, faînes, qu'il oublie l'hiver venu. Ces graines peuvent alors germer assurant ainsi l'extension des forêts.

Plusieurs **pics** sont présents sur la zone: le **pic vert** (*PICUS VIRIDIS*), plutôt présent en lisière, le **pic noir** (*DRYOCOPUS MARTIUS*) qui est le plus grand des pics d'Europe vous le reconnaîtrez car lorsqu'il "tambourine" sur les arbres morts pour en extirper les insectes, toute la forêt résonne ! Également présent le **pic épeiche** (*DENDROCOPOS MAJOR*), plus petit que les deux précédents, il a la taille d'un merle. Avec le **pic épeichette** (*DENDROCOPOS MINOR*), ils sont les deux représentants des pics à dos rayés noir et blanc. L'épeichette est le plus petit et le plus rare sur la zone.

Tous les pics se nourrissent d'insectes qu'ils chassent des troncs d'arbres creux en tambourinant sur ceux-ci. Les insectes ont l'impression de vivre un terrible tremblement de terre et sortent alors pour se mettre à l'abri, c'est ici qu'ils sont attendus. Les pics sont pourvus d'une longue langue gluante sur laquelle viennent s'engluer les insectes et plus particulièrement les fourmis.

Le mulot consomme des glands, des faînes, des noisettes, et, au gré des saisons, tous les autres fruits qu'il trouve.

Qui mange quoi ?



Sur ce panneau sont présents quelques-uns des animaux qui composent la chaîne alimentaire de ce territoire.

La présence de ces animaux est possible grâce à la forêt de chênes et de hêtres. D'autres arbres ou arbustes tels que le noisetier ici même et les églantiers apportent nourriture et refuge pour beaucoup d'espèces animales.

L'aigle royal (AQUILA CHRYSÆTOS), de retour en Ardèche depuis les années 90 est également présent sur le site. Il se situe en haut de la chaîne alimentaire.

N'oublions pas également toute la micro faune composée d'invertébrés (vers, araignées, décomposeurs...) sans laquelle les végétaux et les animaux ne pourraient être présents.



la migration

La migration peut
s'observer au col
de l'Escrinet
de février à mai.

Dès janvier parfois les cigognes s'invitent à la fête ! Ensuite passent fin février et surtout en mars, les étourneaux, les pigeons, d'innombrables passereaux * tels que les pinsons des arbres et pinsons du nord, bergeronnettes, alouettes, verdiers, chardonnerets, hirondelles... Lorsque le temps est favorable, on peut observer des dizaines de milliers de passereaux dans la matinée !

Mars est également le mois des rapaces avec des migrations de centaines de buses, milans noirs et royaux, éperviers, faucons, et surtout une espèce rare et qui s'observe facilement à l'Escrinet, le balbuzard pêcheur, qui est un aigle pêcheur. En avril la migration diminue pour la plupart des espèces sauf pour quelques-unes dont la bondrée apivore pour laquelle la migration débute, elle va se terminer mi mai. Elle fait partie des migrateurs "tardifs", en opposition avec les "précoces", listés ci-dessus. On peut observer à cette période des tourterelles, des coucous, et même des guêpiers d'Europe,

Le temps favorable à l'observation est souvent un vent du nord modéré car les oiseaux volent bas et s'engouffrent à faible altitude dans le col. On a même vu des bergeronnettes traverser la petite route à patte, pour reprendre leur vol une fois le col franchi !



Passereaux : "ordre d'oiseaux comprenant des percheurs et des chanteurs, généralement de petite taille"



les indices de présence

[2 BORNES SOURIRE]

Dès le mois de février **le brocard**, mâle du chevreuil frotte ses bois contre les arbustes pour les débarrasser de leurs velours, enveloppe duveteuse sous laquelle les bois, tombés à l'automne, repoussent.

Plus tard, en avril et jusqu'en août il va continuer à frotter ses bois contre les arbustes pour marquer son territoire. A la base de ses bois le brocard dispose d'une glande odorante. Lorsqu'il commet un frottis il dépose ainsi son odeur sur le végétal. C'est sa façon de communiquer avec ses congénères :

"ce territoire est déjà occupé, gare à celui qui voudrait s'en accaparer !"



Après un bon bain (!) dans la souille que vous allez bientôt découvrir, **le sanglier** se frotte contre les arbres alentours. La boue agglomère les parasites (puces, tiques...), ainsi collés entre eux, le sanglier s'en débarrasse plus facilement.

[LA SOUILLE]

Peut être aurez vous la chance de trouver dans la souille des empreintes fraîches...



... de sanglier

... ou de chevreuil

LA CHASSE

La chasse en Ardèche regroupe environ 12 500 *nemrods**. Plusieurs chasses sont pratiquées.

Celles du sanglier et du chevreuil intéressent plus de 10 000 chasseurs. La population de sangliers en Ardèche est importante, le département connaît depuis quelques années un des plus forts prélèvements de France pour cette espèce qui cause des nuisances.


Les petits gibiers sédentaires tels que lièvres, lapins et perdrix sont présents sur toutes les régions agricoles. Ils sont chassés "*devant soi*". C'est la plus ancienne des chasses qui permet de traquer "*la lèbre*" (lièvre).

Les migrateurs sont très prisés par les chasseurs ardéchois : grives, pigeons et bécasses sont attendus avec passion dès la mi-octobre.

Ces chasses nécessitent une parfaite connaissance du milieu et des éléments naturels.



**Nemrod* : "Homme qui aime beaucoup la chasse"



la déprise agricole

L'avenir de l'espace rural constitue un des enjeux majeurs de la gestion de l'espace en France et dans certains pays d'Europe.

En effet, la disparition prévisible d'un grand nombre d'exploitations agricoles due à l'âge des agriculteurs pose le problème du devenir des parcelles libérées.

Vont-elles être reprises par d'autres agriculteurs, reboisées, laissées en friche ? Il est des zones où le boisement de certaines parcelles risque d'aboutir à une fermeture des paysages qui pourrait mettre en cause certaines options de développement promues en remplacement de l'agriculture, comme le tourisme et donc accentuer la déprise rurale.





La déprise agricole comme sur le site de Blandine où se trouve le sentier a engendré une modification des milieux et le gros gibier en a profité alors que les petits animaux ont vu leur population diminuer.

Sangliers et chevreuils sont présents sur l'ensemble de la commune. Ils se sont développés en utilisant les ressources du milieu : buissons pour le couvert et nourriture forestière : glands, châtaignes. Un peu trop nombreux parfois, surtout pour les sangliers qui se rapprochent ostensiblement des espaces résidentiels et provoquent des nuisances autour des habitations.

Les chasseurs sont les acteurs principaux pour limiter ces populations. Il en est de même pour les chevreuils, présents sur le site mais aussi très discrets.

INFORMATIONS PRATIQUES

- Le col de l'Escrinet est à 787 mètres d'altitude.

- Il se situe à mi chemin entre Privas et Aubenas, soit à un quart d'heure environ des deux villes, sur la route nationale 304.



- Au col, garez votre véhicule.

- A 50 mètres en direction de "Pramailhet", vous trouverez le panneau d'accueil.

- Le parcours a une longueur totale de 2400 m. Comptez environ 2 h. de découverte.

- Des chaussures de marche sont conseillées.

- Accès libre et gratuit.



**Fédération Départementale
des Chasseurs de l'Ardèche**

L'Escrinet - 07200 SAINT-ETIENNE DE BOULOGNE

TÉL : 04 75 87 88 20

EMAIL : fdco7@fdco7.fr

SITE INTERNET : www.fdc07.fr